

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-2-8-91055719



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE  
ET DE LA FORÊT  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA  
LUCCIANA - 20290 - BORGIO -

☎ 95.36.05.70



## EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 203

du 31 juillet 1991

### VIGNE

#### Mildiou

Les conditions climatiques n'étaient guère favorables au développement de ce champignon. Cependant demeurez vigilants.

La veraison, s'amorce déjà sur les cépages Chardonay, Pinot, Alicante.

#### Oïdium

Par contre, on note une pression sensible de cette maladie avec attaque sur grappes dans les parcelles insuffisamment protégées. Il est regrettable que certains viticulteurs aient exagéré l'emploi des I.B.S. à pouvoir "systémique" sur feuilles au détriment du soufre en alternance ou en association avec Dinocap ; ne pas oublier que cette dernière matière active possède un effet freinateur sur acariens.

#### Botrytis

Cette maladie est souvent occultée en Corse ; elle risque de se manifester dans les cépages à grains serrés et notamment en cas d'éclatement provoqués par oïdium. Il convient d'appliquer le programme complet pour escompter une bonne protection. Un seul traitement ne suffit pas.

### ACARIENS

Ne vous laissez pas surprendre par les remontées des populations. Les symptômes sont très visibles, le seuil d'intervention est de deux feuilles occupées sur trois par une araignée rouge, une feuille sur deux par une jaune.

Choisissez votre produit en fonction du stade des acariens (voir tableau du bulletin n° 199).

P.34

### Tordeuse de la grappe

Vol de 3<sup>ème</sup> génération, mais on observe quelques larves dans des grappes de Carignan Utiliser des curatifs pour celles-ci.  
Consulter à nouveau le tableau du bulletin n°201.

### Cochenilles

On observe des migrations de jeunes larves. Les spécialités telles que : DURBAN 2, EKALUX, FINETHYL, SALUT, ULTRACIDE sont efficaces aussi sur tordeuses.

### Cicadelles vertes

Souvent abondantes avec risques de grillure marginale .  
Intervenez sans tarder.

### ARBRES FRUITIERS

#### Cératite

Pas de capture, pas de piqûres, pas de traitement, installer et surveiller toujours les gôbes mouches.

#### PRUNIERS

La troisième génération de carpocapse se manifeste différemment sur les variétés "Primacote, tardicote ou Loreda" . Intervenir avec des produits curatifs

Des vols de capnodes (gros coléoptères noirs) sont observés dans des jeunes vergers de prunus avec dégâts sur jeunes pousses. Badigeonner les troncs avec la formule suivante pour contrarier les pontes déposées par les femelles sur le tronc.

- 60 % de peinture aquilex blanche à l'eau
- 15 % de chasse lapin
- 1 % de D.D.V.P. ou Lindane
- 2 % de bouillie bordelaise.

## OLIVIERS

### Dacus " mouche de l'olive"

Les premières captures sont enregistrées depuis une semaine, "Plaine de Borgo, Querciolo", le seuil d'intervention n'est pas encore dépassé et aucune pique sur fruit atteignant plus de 7 m/m de diamètre n'est observée.

Cependant demeurer prêt à intervenir avec les produits suivants :

MATIERE ACTIVE	Dose g MA/HL	PRODUIT COMMERCIAL
dimethoate	30	NBS SPECIALITES
formothion	40	ANTHIO FORT
phosphamidon	30	DIMECRON
diazinon	30	BASUDINE, KNOX - OUT
ou fenthion	55	LEBAYCID

## AGRUMES

Eclosions des Aleurodes " Dialeurodes citrii" . Intervenez sans tarder contre ce parasite.

### Gommose

Les mesures prophylactiques énoncées dans le bulletin n°200 sont plus efficaces que des traitements chimiques.

Attention certains produits ne sont pas homologués.

L'utilisateur engage sa propre responsabilité en pareil cas.

(C) S.R.P.V. 1991 Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.

=====